Bulletin Oiseaux d'eau-Gibier d'eau

De la Fédération des Chasseurs de la Gironde

JUILLET 2016

Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde
Domaine de Pachan
10 Chemin de Labarde
33290 LUDON MEDOC
Tél. 05.57.88.57.00
Fax 05.57.88.57.01
fdc33@chasseursdefrance.com
www.chasseurs33.com

Ce bulletin renoue avec le réseau de correspondant existant avant la mise en place des carnets de tonne au niveau national. Même si tous les ans, les données sont retranscrites dans le tableau de bord, nous avons souhaité informer tous les chasseurs de gibier d'eau sur les résultats de la saison de chasse mais également sur les suivis techniques que réalisent la Fédération.

Administrateur du pôle migrateurs : J. Francis SEGUY

Administrateur référant « Gibier d'eau» : Guy PINEAU

Directeur scientifique : Jésus VEIGA

Responsable du réseau : Caroline PÉRÉ

Secrétariat du réseau : Karine BERTAUD
Sandrine VIVANCOS

Remerciements à tous les observateurs.

Crédits photos : Stéphane HAMEAUX
Jésus VEIGA

Bilan des chasseurs de gibier d'eau 2015-2016

Une saison 2015-2016 avec une ouverture un peu particulière. Le dernier arrêté du 18 juillet 2013 a été annulé par le Conseil d'État. Il permettait une ouverture anticipée au 1er samedi d'août pour les 4 cantons historiques. L'ouverture s'est donc faite suivant l'arrêté du 2 août 2012.

Ouverture au 1er samedi d'août pour les territoires en bleu, ouverture au 1er jour de la deuxième décade (11 août) pour les territoires en rouge et ouverture au 1er jour de la dernière décade (21 août) pour les territoires en blanc.

1 496 carnets ont été retournés à la Fédération.

- **554** installations n'ont pas été chassées
- **28** installations ont été chassées mais n'ont effectué aucun prélèvement
- **914** carnets ont pu être analysés.



DANS CE BULLETIN

Bilan des chasseurs de gibier d'eau 2
Oie cendrée 3
Hivernage anatidés et limicoles 3
Fréquentation des mares de chasse 4
La reproduction du canard colvert 4

Tableau de chasse 2015-2016

Espèce	Nombre prélevé
Sarcelle d'hiver	14 313
Canard souchet	5 139
Canard colvert	5 001
Canard pilet	2 410
Canard siffleur	2 272
Canard chipeau	1 079
Oie cendrée	524
Sarcelle d'été	418
Foulque macroule	360
Fuligule milouin	254
Fuligule morillon	68
Poule d'eau	28
Râle d'eau	23
Oie rieuse	18
Nette rousse	7
Oie des moissons	6
Harelde de Miquelon	6
Eider à duvet	2

18 espèces d'anatidés et rallidés ont été prélevées.

- Le prélèvement total s'élève à 31 928 individus.
- La sarcelle d'hiver arrive en tête du tableau de chasse



Tableau de chasse des anatidés et des rallidés. La sarcelle d'hiver représente 45%.

Tableau de chasse des limicoles où la bécassine des marais représente 45%.



Oie cendrée

La Fédération a participé au programme d'étude sur l'oie cendrée de 2011 à 2014 suite à la demande du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE).

Il a été montré que la population nord-ouest européenne continue à augmenter et serait estimé à 700 000 individus. Concernant l'hivernage en France, l'effectif a suivi l'évolution numérique de la population nord-ouest européenne. 20 000 individus hiverneraient à la mi-janvier sur notre territoire.

Le suivi des migrations post et prénuptiale a montré que le début des trajets de retour commençait dans la 3ème décade de janvier avec un pic lors de la 2ème décade de février.



Nous tenons à remercier les chasseurs de tonne qui contribuent aux observations des oies cendrées en migration.

Hivernage anatidés et limicoles



La Fédération participe au réseau Oiseaux d'eau-Zones humides depuis les années 80 afin de suivre l'hivernage des anatidés et des limicoles sur le département de la Gironde. Une 30aine de sites sont suivis une fois par mois de décembre à février.

Les comptages sont réalisés en partenariat avec l'ACMBA, l'ONCFS, la RN d'Arguin, la RN de Cousseau et le garde de l'île aux Oiseaux. 28 377 anatidés et rallidés ont été recensés sur le département pour les 3 mois d'hivernage.

Les limicoles sont recensés uniquement à la mi janvier sur deux entités : le Bassin d'Arcachon et l'Anse du Verdon.

Pour le mois de janvier 2016, le comptage s'est déroulé en partenariat avec l'ACMBA, l'ONCFS, la RN d'Arguin, le garde l'île aux Oiseaux, la réserve ornithologique du Teich et la LPO.

Au total, 39 577 limicoles ont été recensés avec toujours en tête le bécasseau variable.



Fréquentation des mares de chasse



Depuis 2007, la Fédération réalise un suivi sur un échantillon de mare de chasse sur les marais du Blayais et du Médoc. Ce suivi est réalisé de mars à août tous les 10 jours par les techniciens de la Fédération mais également par des inspecteurs de l'environnement de l'ONCFS, de stagiaires (CPIE Médoc, Fédération, ONCFS) et du garde particulier de l'ACMBA. Les observateurs notent toutes les espèces d'oiseaux d'eau et leur nombre.

Espèces nicheuses chassables

- Canard colvert
- Vanneau huppé

Espèces nicheuses protégées

- Cygne tuberculé
- Tadorne de Belon
- Échasse blanche
- Avocette élégante
- Cigogne blanche
- Héron cendré
- Aigrette garzette

Depuis 9 ans, 71 espèces d'oiseaux d'eau ont été recensées. Ces mares de chasse sont utilisées comme halte migratoire pour la majorité des oiseaux mais ils peuvent aussi se reproduire sur les mares ou sur les prairies attenantes.

La reproduction du canard colvert

La Fédération a utilisé les données de l'étude précédente pour travailler sur la reproduction du canard colvert en Gironde. L'analyse a permis de comparer la période de reproduction de cette espèce pendant deux périodes (une de 1991 à 1997 et l'autre de 2007 à 2015). Ces données ont été mise en relation avec des données climatiques afin de mettre en évidence le rôle du réchauffement climatique dans la saison de reproduction. Deux publications ont été réalisées en 2012 et 2016 dans le bulletin Faune Sauvage de l'ONCFS.

Les premières analyses ont montré que le réchauffement climatique semblait avoir un impact sur la chronologie de reproduction de cette espèce. Tous les liens ne sont pas encore cernés d'autres facteurs météorologiques peuvent entrer en jeu directement ou indirectement.