SYNTHESE 2024-2025

Bilan départemental

Nombre moyen de bécassines des marais observées par décade lors de la saison 2024-2025 (ICA), comparé à la moyenne des observations depuis 2007



Le pic de migration le plus important se produit lors de la première décade de septembre. Un creux est observé durant les deux décades suivantes en septembre, qui sont habituellement les meilleures. Pendant cette période, les conditions météorologiques étaient défavorables, avec une pluviométrie importante. Les mois de novembre, décembre et janvier présentent des valeurs supérieures à la moyenne, avec notamment un pic notable lors de la première décade de décembre.

Indice d'abondance cynégétique

Nombre moyen de bécassines sourdes observées par décade lors de la saison 2024-2025 (ICA), comparé à la moyenne des observations depuis 2007



L'indice d'abondance cynégétique, avec une moyenne de 8,79 bécassines des marais observées par sortie, est supérieur à la moyenne habituelle de 7,50. Cela permet de considérer la saison 2024-2025 comme favorable, dans la continuité de la saison précédente. Il est également à noter que les marais sont en eau depuis deux saisons, ce qui pourrait contribuer à cette tendance positive.



Au cours de la saison 2024-2025, l'arrivée des premières bécassines sourdes a été globalement tardive par rapport aux années précédentes. Bien que quelques individus isolés aient été observés dès le début octobre, ces détections sont restées marginales. La phase active de migration n'a réellement débuté qu'au cours de la première décade de novembre. Le pic migratoire le plus important a été enregistré durant la deuxième décade de décembre. Il convient également de souligner une présence notable de bécassines sourdes à la fin du mois de janvier.

Indice d'abondance cynégétique



L'indice cynégétique d'abondance (ICA) s'établit cette saison à 0,91, un niveau légèrement inférieur à celui enregistré lors de la saison précédente. Néanmoins, ce résultat demeure supérieur à la moyenne pluriannuelle récente (Moyenne = 0,84), ce qui permet de qualifier la saison de globalement satisfaisante

Age Ratio

Un total de 353 plumages de bécassines exploitables a été collecté et analysé.

- Bécassine des marais (Gallinago gallinago) :
  Parmi les 247 plumages identifiables, l'âge-ratio indique une proportion de juvéniles de 67 %.

- Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) :
  Sur les 93 plumages identifiables, la proportion de juvéniles est de 47 %.

Nous vous remerciant pour votre participation !

Si vous avez la possibilité de nous retourner des ailes la saison prochaine, vous recevrez une fiche comme celle-ci :

VOTRE SYNTHÈSE PERSONNELLE
MR DUPONT

SAISON 2024-2025

25 SORTIES A LA CHASSE

145 BÉCASSINES DES MARAIS VUES (ICA DE 5,76)

20 BÉCASSINES DES MARAIS PRÉLEVÉES

30 BÉCASSINE SOURDE VUE

10 BÉCASSINE SOURDE PRÉLEVÉE

30 AILE ENVOYÉE

RÉCAPITULATIF PERSONNEL DE VOTRE SAISON

	Adulte femelle	Adulte mâle	Adulte indéterminé	Juvénile femelle	Juvénile mâle	Juvénile indéterminé	Indéterminé
Bécassine des marais	5	5		5	4	1	
Bécassine sourde	2	2	1	2	2		1

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION !

Précautions pour bien conditionner les plumages des ailes de bécassines

- **Couper une aile et arracher toutes les plumes de la queue. (Ne pas couper les plumes de la queue)**
- **Faire sécher l'aile avant de la mettre dans l'enveloppe.**
- **Placer le tout dans une enveloppe en papier**
- **Inscrire votre nom ; date et lieu de capture ; l'espèce (bécassine des marais ou sourde)**
- **Stocker les plumages dans un endroit sec**

Adresser en fin de saison de chasse le carnet, ainsi que les enveloppes contenant les prélèvements de plumage.

Si vous n'avez plus d'enveloppe, n'hésitez pas à nous contacter au 05 57 88 97 87, nous vous en ferons parvenir au plus vite.

Si vous connaissez des chasseurs de gibier d'eau qui souhaitent participer à la récolte des plumages, sans faire partie du réseau, faites-le nous savoir !

*Prélever l'intégralité des rectrices pour s'assurer de bien collecter les externes (A et B) et ainsi, éviter les risques de confusions

*Ne mettre le plumage que d'un seul oiseau par enveloppe

*Introduire les plumes et ailes en vrac dans l'enveloppe, sans utiliser d'élastique ou de ruban adhésif