




CANARD CHIPEAU

MARECA STREPERA

Ordre : Ansériformes

Famille : Anatidés

I - ÉCOLOGIE

Le canard chipeau est un canard de surface, légèrement plus petit que le colvert. Il est plus élancé que ce dernier, avec des ailes plus fines et un corps plus étroit. Son plumage est assez terne et uniforme. Il mesure environ 45-55 cm et son poids varie entre 650 et 900 g. Les deux sexes se ressemblent assez au premier abord, mais possèdent des caractéristiques propres permettant de les différencier.

- **Mâle** : Contrairement aux autres espèces de canards, le mâle chipeau possède un plumage discret et peu coloré. La tête est de couleur brun terne avec un bec gris anthracite. Le croupion est noir, avec la queue brun clair. Les parties supérieures du corps sont grises et finement barrées, tandis que le dessous du corps est plutôt blanchâtre. Il possède de longues plumes scapulaires dans les tons gris-beiges. Un net miroir blanc, bordé de noir et de rouille, est présent sur les ailes. En éclipse, son plumage est très similaire à celui de la femelle, c'est-à-dire brun foncé tacheté de gris-brun.

- **Femelle** : Très similaire à la femelle de canard colvert, la canne chipeau présente elle aussi un plumage marron finement tacheté de noir, mais légèrement plus terne et grise. On peut la distinguer par son miroir blanc bien visible et son ventre blanchâtre. Le bec est gris au centre et orangé sur les côtés. Une fine ligne gris-noire barre son œil.

- **Juvénile** : Le plumage juvénile ressemble à celui de la femelle, mais est cependant plus beige, contrastant avec sa tête grise. Comme la femelle, il présente un bec gris avec de l'orange sur les côtés.



REPRODUCTION

Les couples commencent à se former à la fin du mois de mars et sont monogames. Leur nid est construit au sol, dissimulé dans la végétation haute et buissonnante. Le plus généralement, à proximité de l'eau, mais il peut également se trouver dans une prairie humide ou dans un champ. Le nid est composé de feuilles et de duvet, et va abriter entre 8 et 12 œufs, pondus en avril-mai. En cas de destruction du nid ou de la nichée, la femelle peut faire une seconde ponte de substitution. L'incubation, assurée totalement par la femelle, dure environ 24 à 26 jours et les canetons sont nidifuges. La femelle les conduit à l'eau, souvent dans les 24 heures après l'éclosion. Les canetons commencent à se nourrir seuls au bout de quelques semaines. Leur premier envol a lieu à partir de 45 jours et ils atteignent leur maturité sexuelle à l'âge d'un an.



RÉGIME ALIMENTAIRE

Les végétaux constituent l'essentiel de l'alimentation du canard chipeau. Il consomme des pousses de plantes aquatiques, des herbacées, des algues, des graines et des racines. Une grande quantité d'invertébrés et de petits vertébrés viennent compléter son régime alimentaire durant la période de reproduction.




AIRE DE RÉPARTITION

Présent dans tout l'hémisphère Nord, le canard chipeau peuple une grande partie de l'Amérique du Nord et de l'Eurasie. En Europe, il se reproduit dans la partie Nord du Paléarctique occidental et hiverne dans la partie Sud : bassin Méditerranéen, Turquie, vallée du Nil. Les deux types de populations sont retrouvés en France. C'est un migrateur partiel, dont les populations rencontrées en Métropole sont issues notamment des Pays-Bas, d'Allemagne, des pays baltes et du sud de la Fennoscandie. Les populations françaises réalisent aussi des échanges avec la péninsule ibérique et le nord du Maghreb. Des groupes sédentaires sont présents à l'année dans diverses zones françaises comme en Sologne, sur le littoral Atlantique, en Camargue, en Champagne...

Figure 5 :
Carte de répartition du canard chipeau
en Europe (BirdLife International, 2024)

-  Zone de présence continue
-  Zone de présence estivale
-  Zone de présence hivernale
-  Zone de présence en période migratoire



MODE DE VIE ET COMPORTEMENT

Espèce à la fois grégaire et solitaire, le canard chipeau se déplace en groupes de plusieurs dizaines d'individus en période hivernale et durant la migration, puis reste en couple en saison de reproduction. Pendant les parades nuptiales des mâles, ces derniers abaissent leur tête en sifflant et battent des ailes. Une fois les couples formés, les partenaires se livrent à des activités synchronisées de lissage des plumes et de construction de nids. Après éclosion des œufs, le mâle reste à proximité de sa progéniture, apportant protection et assistance. Pour se nourrir, le canard chipeau barbote à la surface, et plonge sa tête et son cou sous l'eau afin d'atteindre les sources de nourriture aquatique. Le barbotage constitue leur comportement alimentaire le plus courant. Les individus se nourrissent souvent en petits groupes, barbotant et plongeant à tour de rôle, pour être plus efficaces dans leur recherche de nourriture et couvrir une plus grande surface. Ils peuvent aussi se nourrir sur terre (surtout en période de reproduction et d'élevage des jeunes) et s'aventurent dans les champs agricoles à la recherche de plantes germées ou de résidus de céréales.

En France, les déplacements postnuptiaux sont constatés à partir du mois d'août. Concernant la migration pré-nuptiale, elle débute au début du mois de février, et s'intensifie surtout en mars.



HABITAT

Espèce de surface, il affectionne particulièrement les zones peu profondes et abritées : étangs, lacs, marais, estuaires, lagunes... Il peut aussi fréquenter les rivières et fleuves à débit lent, ainsi que les milieux saumâtres ou salés en migration ou en hivernage. La présence de végétation riveraine aquatique est nécessaire, surtout en période de reproduction. Ces exigences écologiques en matière d'habitat font de lui une espèce assez sensible en France.



PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX

Largement répandu en Europe avec des effectifs assez conséquents, le canard chipeau n'est pas une espèce globalement menacée. Cependant, comme toute espèce dépendant des zones humides, il peut être affecté par la dégradation de ces milieux. Il subit également les perturbations liées aux usages récréatifs de loisirs des zones humides d'eau douce (dérangement, pollution...). La prédation des nids par le vison d'Amérique constitue un autre facteur de pression. Enfin, le canard chipeau est vulnérable à la grippe aviaire.

II – SUIVI ET ÉTAT DES POPULATIONS EN GIRONDE : RÉSULTATS ET ANALYSES

POPULATIONS NICHEUSES

Depuis 2009, l'espèce est nicheuse en Gironde. Le nombre de couples recensé est faible et les preuves de reproduction sont très rares. Il est observé au moins 1 couple nicheur chaque année dans les marais connexes de l'Estuaire de la Gironde.



POPULATIONS HIVERNANTES



Les effectifs de canards chipeaux dénombrés durant l'hivernage peuvent être très fluctuants. Leur nombre a commencé à augmenter progressivement à partir des années 1990, avant de décroître, puis de se stabiliser autour de 60 à 70 individus entre 2000 et 2010. Suite à une seconde période durant laquelle les effectifs ont augmenté (entre 2010 et 2014), la population hivernante de canards chipeaux semble être stable, avec moins d'une cinquantaine d'individus comptabilisés chaque année.





Figure 6 :
Évolution temporelle de la moyenne mensuelle de canards chipeaux observés en hivernage en Gironde (de décembre à février)



Dans les années 1990, les populations hivernantes étaient principalement localisées sur l'Estuaire de la Gironde, puis autour du Bassin d'Arcachon et dans la zone bordelaise. Cette dernière zone a accueilli plus d'oiseaux durant la période 2003-2013, ceux-ci ayant délaissé la zone de l'Estuaire. A partir des années 2010, les effectifs étaient plutôt bien répartis entre les trois zones.




Figure 7 :

Carte d'évolution temporelle du nombre moyen de canards chipeaux observés en hivernage en Gironde (pas de temps de 10 ans)

BAGUAGE


7 canards chipeaux bagués ont été repris à la chasse en Gironde entre 1990 et 2016. Ces individus avaient tous été bagués dans d'autres pays : 3 en Espagne, 2 en Allemagne, 1 au Royaume-Uni et 1 aux Pays-Bas.

La durée moyenne de port de bague correspond à 2 ans, 1 mois et 16 jours, avec un maximum de 4 ans, 1 mois et 21 jours pour un canard bagué vers Munich en Allemagne, et prélevé à Hourtin.

En termes de distance, le record est détenu par un individu bagué au Nord-Est de l'Allemagne, et repris à Ludon-Médoc. Son lieu de baguage est ainsi distant de 1 452 kilomètres de son lieu de reprise.

Figure 8 :

Carte des baguages et reprises de canards chipeaux en Gironde



III – DONNÉES CYNÉGÉTIQUES

PRÉLÈVEMENTS DANS LES TONNES




Sur la saison 2022-2023, 11 963 canards chipeaux ont été prélevés en France.

89% des prélèvements de cette espèce sont réalisés sur les plans d'eau du Domaine Terrestre et sur le Domaine Public Fluvial.

En Gironde, 1 162 prélèvements ont été prélevés durant cette même saison, représentant ainsi 10% des prises nationales.


Figure 9 :

Prélèvements de canards chipeaux issus des carnets de chasse de nuit au gibier d'eau durant la saison de chasse 2022-2023 (Synthèse nationale FNC-OFB)




Le nombre de canards chipeaux prélevés dans les tonnes girondines est en diminution, mais semble se stabiliser autour des 1 000 individus depuis 2020.

Figure 10 : Evolution temporelle des prélèvements de canards chipeaux en Gironde



IV – CONCLUSION

L'aire de répartition du canard chipeau est extrêmement vaste. Par ailleurs, au vu de la taille de la population très importante et de la tendance à la hausse de celle-ci, l'espèce est évaluée comme étant en « préoccupation mineure » à toutes les échelles : mondiale, européenne et française (oiseaux nicheurs et hivernants).



Alors que la population mondiale est comprise entre 4,3 et 4,9 millions d'individus (Wetlands International, 2015), celle de l'Europe est quant à elle estimée entre 75 400 et 125 000 couples, ce qui équivaut à 151 000 à 250 000 individus matures (BirdLife International, 2015).

La tendance générale des populations est à la hausse, mais avec des variations selon certaines entités géographiques (Wetlands International, 2015). Cette espèce a connu une nette augmentation durant les 40 dernières années en Amérique du Nord (augmentation de 56,9 % par décennie, Butcher et Niven, 2007). La population européenne est estimée comme étant en augmentation (BirdLife International, 2015).

Les effectifs nicheurs en France semblent stables, voire en augmentation sur le long terme. Son expansion géographique est notable sur la partie occidentale du bassin Méditerranéen, dans le Nord et en Bourgogne. Pour les populations hivernantes, celles-ci augmentent de façon significative depuis 1968 (Issa N. & Muller Y., 2015).

Estimation des populations		Tendance d'évolution
Monde	4,3 à 4,9 millions d'individus (Wetlands International, 2015)	Augmentation (Wetlands International, 2015) ↗
Europe	151 000 à 250 000 individus (BirdLife International, 2015)	Augmentation (BirdLife International, 2015) ↗
France	- Oiseaux nicheurs : 1 500 à 1 800 couples - Oiseaux hivernants : 25 663 à 37 919 individus (INPN, 2018)	- Oiseaux nicheurs : - Inconnue (court terme) - En amélioration (long terme +87,5%) - Oiseaux hivernants : - Stable (court terme) - En amélioration (long terme +33%) (INPN, 2018) ↗ =
Gironde	Les dénombrements hivernaux de canards chipeaux sont en légère baisse depuis les années 2010. Ce canard est nicheur en Gironde mais les preuves de reproduction sont rares. Durant l'hivernage, les effectifs se concentrent principalement dans le marais au nord de l'agglomération bordelaise.	= ↘