

SYNTHÈSE DU RÉSEAU BÉCASSINE

BILAN DEPARTEMENTAL

SAISON 2025-2026

La saison 2025-2026 s'est déroulée dans un contexte hydrologique particulièrement favorable. Contrairement aux années marquées par des assècs précoces, les principaux marais girondins sont restés bien en eau dès le début de la saison et tout au long de l'automne, offrant des conditions d'accueil optimales pour les bécassines.

Les observations transmises par les correspondants témoignent d'une saison particulièrement favorable pour les deux espèces en Gironde. Les synthèses ci-après présentent l'évolution des indices d'abondance cynégétique au cours de la migration et de l'hivernage.

■ BÉCASSINE DES MARAIS (GALLINAGO GALLINAGO)




Figure 1 - Nombre moyen de bécassines des marais observées par décennie lors de la saison 2025-2026 (ICA), comparé à la moyenne des observations depuis 2007

Les premiers arrivages ont été relativement progressifs avant un afflux marqué dès la deuxième décennie d'août. Le pic migratoire le plus important de la saison est observé lors de la troisième décennie de septembre, avec un indice très supérieur à la moyenne pluriannuelle. Les effectifs demeurent ensuite soutenus durant tout le mois d'octobre et le début du mois de novembre.

À la suite de la vague de froid de la fin décembre et du début janvier, un nouvel afflux important est enregistré, culminant lors de la première décade de janvier. Cette période s'est également distinguée par plusieurs observations de bécassines présentant des distances de fuite réduites.

L'indice d'abondance cynégétique (ICA) atteint 10,7 bécassines des marais observées par sortie, soit une valeur largement supérieure à la moyenne pluriannuelle (7,5). Il s'agit du deuxième meilleur résultat enregistré depuis le début du suivi en 2007, juste derrière la saison 2013-2014 (11,7).

Cette valeur confirme que la saison 2025-2026 constitue une excellente saison pour la bécassine des marais, portée à la fois par des conditions hydrologiques très favorables et plusieurs épisodes migratoires importants.




Figure 2 - Evolution de l'ICA Bécassine des marais entre les saisons cynégétiques de 2007 à 2026

■ BÉCASSINE SOURDE (LYMNOCRYPTES MINIMUS)

L'arrivée des bécassines sourdes intervient toujours plus tardivement que celle de la bécassine des marais. Les premières observations significatives sont enregistrées au cours de la première décade d'octobre, avant une forte augmentation des effectifs dès la deuxième décade d'octobre.

La migration automnale est particulièrement soutenue entre la fin octobre et le mois de novembre, avec des effectifs régulièrement supérieurs aux moyennes observées depuis le début du suivi. Malgré une légère baisse au cours de la deuxième décade de décembre, la présence de l'espèce reste importante jusqu'à la fin de la saison, avec un nouvel afflux observé au mois de janvier.

Comme pour la bécassine des marais, la vague de froid de la fin décembre et du début janvier semble avoir favorisé le stationnement des oiseaux.




Figure 3 - Nombre moyen de bécassines sourdes observées par décade lors de la saison 2025-2026 (ICA), comparé à la moyenne des observations depuis 2007

L'indice d'abondance cynégétique s'établit à 1,4 bécassine sourde observée par sortie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne pluriannuelle (0,85). Il s'agit du deuxième meilleur résultat obtenu depuis le début du suivi, derrière la saison 2019-2020 (1,8).

La saison 2025-2026 peut ainsi être considérée comme particulièrement favorable pour la bécassine sourde, confirmant la bonne dynamique observée cette année sur l'ensemble des zones humides girondines.




Figure 4 - Evolution de l'ICA Bécassine sourde entre les saisons cynégétiques de 2007 à 2026

AGE RATIO ET SEX-RATIO

Un total de 544 plumages de bécassines exploitables a été collecté et analysé.

- Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) :**
Parmi les **362 plumages identifiables**, l'âge-ratio indique une proportion élevée de juvéniles, qui représentent **79,8 %** des individus. Le sex-ratio est en faveur des femelles, qui représentent **60 %** des individus identifiés.
- Bécassine sourde (*Limnocryptes minimus*) :**
Sur les **182 plumages identifiables**, la proportion de juvéniles s'élève à **68 %**. Le sex-ratio est également largement en faveur des femelles, qui représentent **73 %** des individus identifiés.

Nous vous remercions pour votre participation à la collecte des plumages, qui permet d'améliorer les connaissances sur la composition des populations de bécassines fréquentant la Gironde.

Si vous avez la possibilité de nous retourner des ailes la saison prochaine, vous recevrez une fiche comme celle-ci :

VOTRE SYNTHÈSE PERSONNELLE
MR DUPONT
SAISON 2024-2025

25 SORTIES À LA CHASSE
145 BÉCASSINES DES MARAIS VUES (E CAR DE 10/10)
20 BÉCASSINES DES MARAIS PHÉLÈVES
30 BÉCASSINE SOURDE VUE
10 BÉCASSINE SOURDE PHÉLÈVE
30 AILES ENVOYÉES

RÉCAPITULATIF PERSONNEL DE VOTRE SAISON						
	Adulte femelle	Adulte mâle	Adulte indéterminé	Juvenile femelle	Juvenile mâle	Juvenile indéterminé
Bécassine des marais	5	5		5	4	1
Bécassine sourde	2	2	1	2	2	1


NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE PARTICIPATION !

■ PRÉCAUTIONS POUR BIEN CONDITIONNER LES PLUMAGES DES AILES DE BÉCASSINES

- Couper une aile et arracher toutes les plumes de la queue (ne pas couper les plumes de la queue).
- Faire sécher l'aile avant de la mettre dans l'enveloppe.
- Placer le tout dans une enveloppe en papier
- Inscrire votre nom ; date et lieu de capture ; l'espèce (bécassine des marais ou sourde)
- Stocker les plumages dans un endroit sec
- Adresser en fin de saison de chasse le carnet, ainsi que les enveloppes contenant les prélèvements de plumage.

Si vous n'avez plus d'enveloppes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 57 88 97 87. Nous vous en ferons parvenir au plus vite.

Si vous connaissez des chasseurs de gibier d'eau qui souhaitent participer à la récolte des plumages, sans faire partie du réseau, faites-le nous savoir !



Karine BERTAUD
Service administratif

✉ karine.bertaud@fdc33.com

☎ 05.57.88.97.87